

Der Bienenweide- und Umweltobmann vom Imkerverband Berlin informiert

Liebe Imkerfreunde,

09.08.2022

viele haben schon den Schmetterlingsflieder / Gewöhnlicher Sommerflieder (*Buddleja davidii*) in unterschiedlichen Farben wie in lila, weiß, rosa usw. in dem eigenen Garten gepflanzt. Die Blütezeit beginnt im Juni und dauert bis in den September. Der Schmetterlingsflieder ist daher als Nektarquelle für den Spätsommer für sehr viele verschiedene Insekten begehrt, wie z.B. die schwarze Holzbiene, unterschiedliche Hummelarten, Nachtfalter und Schmetterlinge.

Wir müssen aber immer dabei bedenken, dass der Schmetterlingsflieder ein Neophyt ist und sich rasch durch Samen ausbreitet. Daher empfehle ich die abgeblühten Blühsrispen rechtzeitig mit einer Schere zu entfernen, damit die Samen am Strauch nicht ausreifen kann. Das Schnittgut kann für den Kompost verwendet werden. Mit diesem Schnitt fördere ich auch eine verlängerte Blütezeit.

Blühender Schmetterlingsflieder mit nektarsuchenden Insekten



Der Bienenweide- und Umweltobmann vom Imkerverband Berlin informiert

Schmetterlingsflieder zum Teil den abgeblühten Rispen



Der Sommerschnitt vom Schmetterlingsflieder



Der Bienenweide- und Umweltobmann vom Imkerverband Berlin informiert

Schmetterlingsflieder nach dem Schnitt

